ドリルの解答

- A** (1) HCl (2) H₂SO₄ (3) HNO₃ (4) CH₃COOH
 (5) (COOH)₂(または H₂C₂O₄) (6) H₂S (7) H₃PO₄
- B** (1) NaOH (2) Ba(OH)₂ (3) Al(OH)₃ (4) Cu(OH)₂
 (5) NH₃ (6) Mg(OH)₂
- C** (1) HNO₃ → H⁺+NO₃⁻
 (2) CH₃COOH ⇌ CH₃COO⁻+H⁺^①
 (3) H₂SO₄ ⇌ 2H⁺+SO₄²⁻ (H₂SO₄ → 2H⁺+SO₄²⁻)
 (4) Ca(OH)₂ → Ca²⁺+2OH⁻
 (5) NH₃+H₂O ⇌ NH₄⁺+OH⁻
- D** (1) 硝酸は1価の強酸なので、水素イオン濃度は、
 [H⁺]=0.10mol/L×1=0.10mol/L
 (2) 硫酸は2価の強酸なので、水素イオン濃度は、
 [H⁺]=0.010mol/L×2=0.020mol/L=2.0×10⁻²mol/L
 (3) 酢酸は1価の弱酸なので、水素イオン濃度は、電離度が0.016から、
 [H⁺]=0.10mol/L×0.016=0.0016mol/L=1.6×10⁻³mol/L
- E** [H⁺]=1.0×10^{-a}mol/Lのとき、pH=aである。
 (1) 0.10mol/L=1.0×10⁻¹mol/Lなので、pH=1
 (2) pH=5 (3) pH=7 (4) pH=11
- F** pH=aのとき、[H⁺]=1.0×10^{-a}mol/Lである。
 (1) 1.0×10⁻¹mol/L(0.10mol/L) (2) 1.0×10⁻³mol/L
 (3) 1.0×10⁻⁷mol/L (4) 1.0×10⁻⁹mol/L
 (5) 1.0×10⁻¹²mol/L

① 酢酸 CH₃COOH では、CH₃中のHは電離しない。

131. 酸・塩基の定義

解答 (ア) 水素(オキシニウム) (イ) 水酸化物 (ウ) 溶けやすい
 (エ) 与える (オ) 受け取る (カ) 溶けにくい

(問) ① NH₃+H₂O ⇌ NH₄⁺+OH⁻ ② HCl+NH₃ → NH₄Cl

解説 アレニウスの定義では、水溶液中で水素イオンH⁺を生じる物質が酸、水酸化物イオンOH⁻を生じる物質が塩基である。水溶液中で、水素イオンH⁺はオキシニウムイオンH₃O⁺になっている。

アンモニアNH₃は分子中にOHを含んでいないが、水と反応するとOH⁻を1つ生じるので、1価の塩基に分類される。

ブレンステッド・ローリーの定義では、陽子H⁺を与える物質が酸、陽子を受け取る物質が塩基である。水酸化銅(II)Cu(OH)₂は水に溶けにくく、アレニウスの定義では、酸・塩基に分類しにくい。しかし、水酸化銅(II)は、陽子を受け取ることができ^①、ブレンステッド・ローリーの定義では塩基に分類される。

また、気体の塩化水素HClは気体のアンモニアと反応して、塩化アンモニウムNH₄Clの白煙を生じる。これは次の化学反応式で表される。

① 水酸化銅(II)の沈殿は塩酸や硫酸水溶液に溶ける。

このような反応でも、塩化水素はアンモニアに陽子 H^+ を与えているので酸、アンモニアは陽子を受け取っているため塩基に分類される。

Check 酸・塩基の定義

	アレニウスの定義	ブレンステッド・ローリーの定義
酸	水溶液中で水素イオン H^+ を生じる物質	相手に陽子 H^+ を与える物質
塩基	水溶液中で水酸化物イオン OH^- を生じる物質	相手から陽子 H^+ を受け取る物質

塩基のうち、水に溶けるものはアルカリともよばれる。

132. ブレンステッド・ローリーの定義

解答 (1) 塩基 (2) 酸 (3) 塩基

解説 ブレンステッド・ローリーの定義では、相手に H^+ (陽子) を与える分子やイオンが酸、相手から H^+ を受け取る分子やイオンが塩基である。

- (1) H_2O は、 HSO_4^- から H^+ を受け取って H_3O^+ になっているので、塩基である。
 (2) HCO_3^- は OH^- に H^+ を与えて CO_3^{2-} になっているので、酸である。
 (3) $Cu(OH)_2$ は HCl から H^+ を受け取っているため、塩基である。
 $Cu(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2H_2O$

133. 酸・塩基の分類

解答 (1) (ク), (ケ) (2) (オ), (カ) (3) (ア), (ク), (コ)

解説 それぞれを化学式で表すと価数を判断しやすい。

- (ア) HCl 1 価の強酸 (イ) $Mg(OH)_2$ 2 価の弱塩基
 (ウ) H_3PO_4 3 価の弱酸 (エ) CH_3COOH 1 価の弱酸
 (オ) NH_3 1 価の弱塩基 (カ) KOH 1 価の強塩基
 (キ) $Al(OH)_3$ 3 価の弱塩基 (ク) H_2SO_4 2 価の強酸
 (ケ) $(COOH)_2$ 2 価の弱酸 (コ) HNO_3 1 価の強酸

- (1) 2 価の酸は、(ク)の硫酸と(ケ)のシュウ酸である。
 (2) 1 価の塩基は、(オ)のアンモニア、(カ)の水酸化カリウムである。
 (オ)のアンモニアは、分子中に OH をもたないが、水と反応すると OH^- を 1 つ生じるので、1 価の塩基に分類される。

また、ブレンステッド・ローリーの定義では、アンモニアは、次のように H^+ を 1 つ受け取ることができる^①ため、1 価の塩基に分類される。

- (3) 強酸は(ア)の塩化水素、(ク)の硫酸、(コ)の硝酸である。

134. 酸・塩基のモル濃度

解答 (ア) 5.0×10^{-2} (イ) 5.0×10^{-2} (ウ) 0.10 (エ) 5.6×10^2
 (オ) 5.0×10^{-2} (カ) 0.25

解説 (1) 酢酸 CH_3COOH のモル質量は 60 g/mol なので、酢酸 1.5 g を溶かして 500 mL にした水溶液のモル濃度は、

$$\frac{(1.5/60) \text{ mol}}{(500/1000) \text{ L}} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

ブレンステッド・ローリーの定義はイオンにも適用できる。

① シュウ酸は $H_2C_2O_4$ とも表される。

② アンモニア分子とアンモニウムイオン

$$\textcircled{1} \frac{1.5 \text{ g}}{60 \text{ g/mol}} = \frac{1.5}{60} \text{ mol}$$

(2) 混合水溶液中のHClの物質量は、0.10 mol/Lの塩酸100 mLに含まれるHClと0.20 mol/Lの塩酸200 mLに含まれるHClの和である。

$$0.10 \text{ mol/L} \times \frac{100}{1000} \text{ L} + 0.20 \text{ mol/L} \times \frac{200}{1000} \text{ L} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

混合水溶液の全量が500 mLとなっているので、そのモル濃度は、

$$\frac{5.0 \times 10^{-2} \text{ mol}}{500/1000 \text{ L}} = 0.10 \text{ mol/L}$$

(3) 0.25 mol/Lのアンモニア水100 mLに含まれるNH₃の物質量は、

$$0.25 \text{ mol/L} \times \frac{100}{1000} \text{ L} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

したがって、このNH₃の0°C、1.013×10⁵ Paにおける体積は、

$$22.4 \text{ L/mol} \times 2.5 \times 10^{-2} \text{ mol} = 0.56 \text{ L} = 5.6 \times 10^2 \text{ mL}$$

(4) (COOH)₂·2H₂Oのモル質量は126 g/molなので、その6.3 gは、

$$\frac{6.3 \text{ g}}{126 \text{ g/mol}} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

1 molの(COOH)₂·2H₂Oには(COOH)₂が1 mol含まれているので、溶質の(COOH)₂も5.0×10⁻² molとなる。したがって、これを水に溶かして200 mLにした水溶液のモル濃度は、

$$\frac{5.0 \times 10^{-2} \text{ mol}}{200/1000 \text{ L}} = 0.25 \text{ mol/L}$$

135. 水素イオン濃度

解答 (1) $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (2) $2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$

(3) $1.0 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$ (4) $5.0 \times 10^{-12} \text{ mol/L}$

解説 c [mol/L]の1価の酸(電離度 α)の水溶液では、 $[\text{H}^+] = c\alpha$ [mol/L]、 c [mol/L]の1価の塩基(電離度 α)の水溶液では、 $[\text{OH}^-] = c\alpha$ [mol/L]となる。また、水酸化バリウムBa(OH)₂などの2価の強塩基では、完全電離によって次のように2倍のOH⁻を生じている。

(1) 水でうすめて、モル濃度を10/1000倍にしたので、塩酸のモル濃度は $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ となる。塩化水素は1価の強酸なので、 $[\text{H}^+]$ は、

$$[\text{H}^+] = c\alpha = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 1 = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

(2) 酢酸は1価の弱酸であり、0.20 mol/Lの酢酸水溶液中で、その電離度は0.010なので、 $[\text{H}^+]$ は、

$$[\text{H}^+] = c\alpha = 0.20 \text{ mol/L} \times 0.010 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

(3) 水酸化バリウムは2価の強塩基であり、完全に電離するので、その0.050 mol/L水溶液の水酸化物イオン濃度 $[\text{OH}^-]$ は、

$$[\text{OH}^-] = c \times 2 = 0.050 \text{ mol/L} \times 2 = 0.10 \text{ mol/L}$$

$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$ なので、

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2}{0.10 \text{ mol/L}} = 1.0 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$$

(4) アンモニアは1価の弱塩基であり、0.10 mol/L水溶液中で、その電離度が0.020なので、水酸化物イオン濃度は、

$$[\text{OH}^-] = c\alpha = 0.10 \text{ mol/L} \times 0.020 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$ なので、

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2}{2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}} = 5.0 \times 10^{-12} \text{ mol/L}$$

136. 水素イオン濃度と pH

解答 (ア) 4 (イ) 酸 (ウ) 10 (エ) 塩基 (オ) 10^{-4} (カ) 5 (キ) 10 (ク) 7

解説 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-a} \text{ mol/L}$ のとき, $\text{pH} = a$ である。

(1) $[H^+] = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ から, $\text{pH} = 4$ となる。この水溶液は酸性を示す。

(2) 図から, $[OH^-]$ が $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ のとき, $[H^+]$ は, $1.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$ となるので, pH は 10 となる。この水溶液は塩基性を示す。

別解 $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ なので, 水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$ から,

$$[H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2}{1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}} = 1.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$$

したがって, $\text{pH} = 10$ となる。

(3) $\text{pH} = 6$ から $[H^+] = 1.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 2$ から $[H^+] = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ なので,

$$\frac{1.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}}{1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ 倍}$$

(4) 水でうすめるとき, 10 倍にうすめるたびに pH が 1 ずつ変化して, 中性の 7 に近づいていく。したがって, pH が 3 のときは 5, pH が 12 のときは 10 になる。

(5) 水でうすめる場合, pH は最終的に中性の 7 に近づく。 pH が 8 の水溶液に水をいくら加えても, 7 をこえて酸性になることはないので, 注意が必要である。

137. 水素イオン濃度と pH

解答 ②

解説 ① (誤) 水分子が $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ のように電離するため, 酸性, 中性, 塩基性のいずれの水溶液にも H^+ と OH^- が共存している^①。

② (正) 酸性の水溶液では $[H^+] > [OH^-]$, 中性では $[H^+] = [OH^-]$, 塩基性では $[H^+] < [OH^-]$ である。

③ (誤) pH が 5 の水溶液では $[H^+] = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, pH が 2 の水溶液では, $[H^+] = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ である。したがって, 水素イオン濃度の比は, 次のように 1/1000 倍となる。

$$\frac{1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}}{1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}} = 1.0 \times 10^{-3} = \frac{1}{1000}$$

④ (誤) $\text{pH} = 6$ (酸性) の水溶液を水で 1000 倍にうすめても, $\text{pH} = 9$ (塩基性) の水溶液にはならず, 中性 ($\text{pH} = 7$) に近づいていく。これは, 水自身の電離が無視できなくなる^② ためである。

⑤ (誤) $\text{pH} = 1$ の強酸の水溶液と $\text{pH} = 3$ の強酸の水溶液を 1 L ずつ混合した場合を考える。 $\text{pH} = 1$ の水溶液では, $[H^+]$ が $1.0 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$ なので, 1 L に含まれる H^+ は $1.0 \times 10^{-1} \text{ mol/L} \times 1 \text{ L} = 1.0 \times 10^{-1} \text{ mol} = 0.10 \text{ mol}$ である。同様に, $\text{pH} = 3$ の水溶液 1 L に含まれる H^+ は $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} = 0.0010 \text{ mol}$ である。これらを混合すると, 水溶液の体積は 1 L + 1 L = 2 L となり, その中に H^+ が $0.10 \text{ mol} + 0.0010 \text{ mol} = 0.101 \text{ mol}$ 存

➡

pH が 7 よりも小さいほど酸性は強く, 7 よりも大きいほど塩基性が強くなる。 pH が 1 大きくなるたびに, $[H^+]$ は 1/10 になる。また, 酸や塩基の水溶液を水でうすめると, pH は中性の 7 に近づいていく。

① 25°C の水溶液では, 常に水のイオン積 K_w は $1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$ であり, 中性の水溶液の pH は 7 になる。

① $[H^+]$ と $[OH^-]$ の積は常に一定となる。

② 水 H_2O もごくわずかに電離して, H^+ と OH^- になっている。

在するので、混合水溶液の水素イオン濃度は、次のようになる。

$$[\text{H}^+] = \frac{0.101 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0.0505 \text{ mol/L}$$

一方、 $\text{pH}=2$ の水溶液の $[\text{H}^+]$ は 0.010 mol/L である。したがって、混合水溶液の方が $[\text{H}^+]$ が大きく、酸性が強くなるので、 pH は2よりも小さくなる。

138. 水溶液の pH

解答 (1) 2.0×10^{-2} (2) 10 (3) 1.4 (4) 1.7

解説 1 価の酸(電離度 α)の c [mol/L] の水溶液では、 $[\text{H}^+] = c\alpha$ [mol/L] である。同様に、1 価の塩基の場合は $[\text{OH}^-] = c\alpha$ [mol/L] となる。塩基の水溶液では、水のイオン積 K_w を用いて $[\text{H}^+]$ を求める。

(1) pH が 3.0 のとき、 $[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ となる。電離度を α とすると、

$$[\text{H}^+] = c\alpha = 0.050 \text{ mol/L} \times \alpha = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad \alpha = 2.0 \times 10^{-2}$$

(2) 0°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ の気体 1 mol の体積は 22.4 L ($22.4 \times 10^3 \text{ mL}$) なので、 56 mL のアンモニアを溶かして 500 mL にした水溶液のモル濃度は、

$$\frac{56 \text{ mL}}{\frac{22.4 \times 10^3 \text{ mL/mol}}{500/1000 \text{ L}}} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

したがって、 $[\text{OH}^-] = c\alpha = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 0.020 = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 水のイオン積から、

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2}{1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}} = 1.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = 10$$

別解 塩基の pH を求めるときは、 pOH を用いると便利である。

$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \text{ ①}$$

このアンモニア水の $[\text{OH}^-]$ は $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ なので、

$$\text{pOH} = -\log_{10}(1.0 \times 10^{-4}) = 4$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 10$$

(3) $[\text{H}^+] = c\alpha = 0.040 \text{ mol/L} \times 1 = 4.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ なので、

$$\text{pH} = -\log_{10}(4.0 \times 10^{-2}) = 1.40 \text{ ②}$$

(4) 硫酸 H_2SO_4 は 2 価の酸であり、完全に電離するので、

$$[\text{H}^+] = 0.010 \text{ mol/L} \times 2 = 2.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(2.0 \times 10^{-2}) = 1.70 \text{ ③}$$

① $[\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$ において、両辺の対数をとると、 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ となる。

② $-\log_{10}(4.0 \times 10^{-2}) = 2 - \log_{10}4 = 2 - 2\log_{10}2 = 2 - 2 \times 0.30 = 1.40$

③ $-\log_{10}(2.0 \times 10^{-2}) = 2 - \log_{10}2.0 = 2 - 0.30 = 1.70$

Check 水のイオン積と水素イオン指数

水のイオン積 $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$ (25°C)

水素イオン指数 $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] \quad [\text{H}^+] = b \times 10^{-a} \text{ mol/L}$ のとき、 $\text{pH} = a - \log_{10} b$

$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-] \quad \text{pH} + \text{pOH} = 14$

139. 酸・塩基の定義

解答 (ア), (ウ), (エ)

解説 プレンステッド・ローリーの定義では、相手に陽子 H^+ を与える物質が酸、相手から陽子 H^+ を受け取る物質が塩基である。

(ア) (酸) 左向きの変化^①で、 NH_4^+ は OH^- に H^+ を与えているので酸である。

(イ) (塩基) 右向きの変化で、 H_2O は H_2SO_4 から H^+ を受け取っているため塩基である^②。

(ウ) (酸) 右向きの変化で、 H_2O は CH_3COO^- へ H^+ を与えているので酸である^②。

(エ) (酸) 左向きの変化で、 HCO_3^- は OH^- へ H^+ を与えているので酸である。

(オ) (塩基) 右向きの変化で、 $Al(OH)_3$ 中の OH^- が H^+ を受け取って H_2O になっているので、 $Al(OH)_3$ は塩基である。

140. 酸・塩基の水溶液

解答 ⑤

解説 ① (誤) アンモニア NH_3 のように分子内に OH をもっていない物質^①でも、水と反応して OH^- を生じ、弱い塩基性を示す。

② (誤) 酸と塩基の反応(中和)では、酸・塩基の価数が関係する。たとえば、硫酸 H_2SO_4 のような 2 価の酸の水溶液と、水酸化ナトリウム $NaOH$ のような 1 価の塩基の水溶液の反応では、酸と塩基の濃度と体積が等しいとき、反応は完結せずに中性にはならない。また、酢酸 CH_3COOH 水溶液と $NaOH$ 水溶液のような価数の等しい酸と塩基の中和でも、生じた塩が加水分解して塩基性を示す場合もある。

③ (誤) 弱酸の電離度は、一定温度でも濃度によって変化する^②。

④ (誤) pH 4 の塩酸の水素イオン濃度は $[H^+] = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ なので、この塩酸 100 mL に含まれる水素イオン H^+ の物質量は、

$$1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times \frac{100}{1000} \text{ L} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

同様に、pH 6 の塩酸 100 mL 中の H^+ の物質量は、

$$1.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \times \frac{100}{1000} \text{ L} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

したがって、これらを 100 mL ずつ混合した水溶液の $[H^+]$ は、

$$[H^+] = \frac{1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} + 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol}}{\frac{100 + 100}{1000} \text{ L}} = 5.05 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

一方、pH 5 の水溶液の $[H^+]$ は $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ であり、両者は異なる。

⑤ (正) 水溶液の酸性の強弱は、酸の濃度や価数だけでなく、電離度にも左右される。たとえば、同じ濃度でも、1 価の強酸である硝酸 HNO_3 の水溶液の方が、2 価の弱酸であるシュウ酸 $(COOH)_2$ の水溶液よりも強い酸性を示す。

① $\rightleftharpoons$ で示された反応は、右向きにも左向きにも進行する。生成物側に下線が引かれている場合は、左向きに変化を見て判断する。

② (イ), (ウ) のように、 H_2O は反応する相手によって酸にも塩基にもなる。

① 酢酸ナトリウム

CH_3COONa のように、弱酸と強塩基からなる塩も、水と反応して弱い塩基性を示す。

② 弱酸の電離度は濃度がうすいほど大きくなる。

141. 酸・塩基の水溶液

解答 (1) ④ (2) ④

解説 (1) (A)~(D)の水溶液中の酸・塩基は、次のようになる。

- (A) アンモニア：弱塩基 (B) 塩化水素^①：強酸
(C) 酢酸：弱酸 (D) 水酸化ナトリウム：強塩基

同じ濃度(0.10mol/L)の1価の酸・塩基の水溶液を比較すると、強酸は弱酸よりも電離度が大きく^②、水素イオン濃度[H⁺]が大きい。同様に、強塩基は弱塩基よりも電離度が大きく、水酸化物イオン濃度[OH⁻]が大きい。また、水溶液中の[H⁺]が大きいほど[OH⁻]は小さく、[OH⁻]が大きいほど[H⁺]は小さい^③。

したがって、(A)~(D)の水溶液中の[H⁺]および[OH⁻]の大きさは、

$$[H^+] \quad (B) > (C) > (A) > (D)$$

$$[OH^-] \quad (B) < (C) < (A) < (D)$$

(2) [H⁺]=1.0×10^{-a}mol/Lのとき、水素イオン指数pHはaと表され、[H⁺]が大きいほどpHは小さい値となる^④。(1)から、[H⁺]の大きさは、(B)>(C)>(A)>(D)なので、pHの大きさは(B)<(C)<(A)<(D)となる。

142. 濃度と電離度

解答 (1) 1.2×10⁻³mol/L (2) 0.70倍

解説 c[mol/L]の1価の塩基の電離度をαとすると、水溶液の水酸化物イオン濃度[OH⁻]=cα[mol/L]と表される。

(1) 0.080mol/Lのアンモニア水中のアンモニアの電離度は、グラフから0.015と読み取れるので、その[OH⁻]は次のようになる。

$$[OH^-] = 0.080 \text{ mol/L} \times 0.015 = 1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

これと同じ[OH⁻]を示す水酸化ナトリウム水溶液の濃度をc[mol/L]とすると、水酸化ナトリウムは強塩基なので、次式が成り立つ。

$$[OH^-] = c \text{ [mol/L]} \times 1 = 1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad c = 1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

(2) 0.080 mol/Lのアンモニア水を2倍に希釈すると、濃度は0.040 mol/Lになる。このときのアンモニアの電離度をグラフから読み取ると0.021なので、[OH⁻]は次のように求められる。

$$[OH^-] = 0.040 \text{ mol/L} \times 0.021 = 8.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

したがって、

$$\frac{8.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L}}{1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}} = 0.70 \text{ 倍}$$

143. 混合水溶液のpH

解答 (1) ③ (2) ① (3) ②

解説 酸の水溶液と塩基の水溶液を混合すると、酸から生じるH⁺と塩基から生じるOH⁻が次のように反応して、水H₂Oを生じる。

① 塩酸は塩化水素の水溶液である。

② 電離度αは、強酸・強塩基ではほぼ1、弱酸・弱塩基ではα≪1と考えてよい。たとえば、25℃で、0.10mol/Lの酢酸の電離度は0.016である。

③ 一定温度の水溶液中の[H⁺]と[OH⁻]の積は常に一定であり、これを水のイオン積K_wという。25℃では、

$$K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} \text{ (mol/L)}^2 \text{ である。}$$

④ pHは、-log₁₀[H⁺]で求められる。

弱酸や弱塩基の電離度は濃度が小さくなるほど大きくなる。

酸から生じるH⁺の物質量と、塩基から生じるOH⁻の物質量を比較する。混合によって体積が増える点に注意する。

問題 144

(1) 0.0030 mol/L の希塩酸 10 mL 中の H^+ の物質量は、塩化水素が強酸なので、

$$\text{H}^+ : 0.0030 \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 3.0 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

0.0010 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 10 mL 中の OH^- の物質量は、水酸化ナトリウムが強塩基なので、

$$\text{OH}^- : 0.0010 \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

したがって、混合後に H^+ が $3.0 \times 10^{-5} \text{ mol} - 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol}$ 残る。混合によって水溶液の体積は $10 \text{ mL} + 10 \text{ mL} = 20 \text{ mL}$ になっているので、混合水溶液の $[\text{H}^+]$ は、

$$[\text{H}^+] = \frac{2.0 \times 10^{-5} \text{ mol}}{20/1000 \text{ L}} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad \text{pH} = 3$$

(2) 0.40 mol/L の硝酸水溶液 10 mL に含まれる H^+ の物質量、0.10 mol/L の水酸化バリウム水溶液 10 mL に含まれる OH^- の物質量は、

$$\text{H}^+ : 0.40 \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{OH}^- : 0.10 \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} \times 2^{\textcircled{1}} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

したがって、混合後に H^+ が $4.0 \times 10^{-3} \text{ mol} - 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 残る。混合によって水溶液の体積は 20 mL になっているので、混合水溶液の $[\text{H}^+]$ は、

$$[\text{H}^+] = \frac{2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}}{20/1000 \text{ L}} = 1.0 \times 10^{-1} \text{ mol/L} \quad \text{pH} = 1$$

(3) 0.040 mol/L の希硫酸 10 mL に含まれる H^+ の物質量、0.060 mol/L の水酸化カリウム水溶液 10 mL に含まれる OH^- の物質量は、

$$\text{H}^+ : 0.040 \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} \times 2^{\textcircled{2}} = 8.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{OH}^- : 0.060 \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 6.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

したがって、混合後に H^+ が $8.0 \times 10^{-4} \text{ mol} - 6.0 \times 10^{-4} \text{ mol} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$ 残る。混合によって水溶液の体積は 20 mL になっているので、混合水溶液の $[\text{H}^+]$ は、

$$[\text{H}^+] = \frac{2.0 \times 10^{-4} \text{ mol}}{20/1000 \text{ L}} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \quad \text{pH} = 2$$

① 水酸化バリウム

$\text{Ba}(\text{OH})_2$ は 2 価の強塩基なので、2 倍している。

② 硫酸 H_2SO_4 は 2 価の強酸なので、2 倍している。

Check 混合水溶液と $[\text{H}^+]$, $[\text{OH}^-]$

強酸と強塩基の混合水溶液で酸が余るとき

$$[\text{H}^+] = \frac{\text{酸の } \text{H}^+ \text{ の物質量} [\text{mol}] - \text{塩基の } \text{OH}^- \text{ の物質量} [\text{mol}]}{\text{混合水溶液全体の体積} [\text{L}]}$$

強酸と強塩基の混合水溶液で塩基が余るとき

$$[\text{OH}^-] = \frac{\text{塩基の } \text{OH}^- \text{ の物質量} [\text{mol}] - \text{H}^+ \text{ の物質量} [\text{mol}]}{\text{混合水溶液全体の体積} [\text{L}]}$$

144. 多段階電離

解答 ④

解説 硫酸は2価の強酸であり、その電離は2段階に進行する。

c [mol/L] 硫酸水溶液について、まず1段階目は完全に電離するので、その変化は濃度 c を用いて次のように表される。

電離前 c 0 0 [mol/L]

電離後 0 c c [mol/L]

2段階目の電離度が α_2 なので、 HSO_4^- の電離は次のように表される。

電離前 c 0 c [mol/L]

変化量 $-c\alpha_2$ $+c\alpha_2$ $+c\alpha_2$ [mol/L]

電離後 $c(1-\alpha_2)$ $c\alpha_2$ $c+c\alpha_2$ [mol/L]

したがって、 $[\text{H}^+] = c(1+\alpha_2)$ [mol/L] となり、④が該当する。

一般に、多段階の電離がおこる場合、1段階目の電離度が最も大きく、2段階目以降は徐々に小さくなる。